

Bijsluiter bij thyreoidum capsules/tabletten.

Lees ook het informatieblad VI-21 (Medicijnen bij een trage schildklier)

Het gehalte van de schildklierhormonen in de diverse doseringen.

Behorende bij THYREOIDUM chargenr 54171444

caps of tabl	gehalte in mcg per gram thyreoidum	T4 (levothyroxine) 586	T3 (liothyronine) 134	samen	T3/T4
	mg/caps	in microgram	in microgram	doorsnee tablet	
caps 5		2,92	0,69		1/4
tabl 15		8,76	2,07	8mm	1/4
tabl 30		17,52	4,14	9mm	1/4
caps 50		29,2	6,9		1/4
tabl 60		35,04	8,28	10mm	1/4
caps 90		52,56	12,42		1/4
tabl 120		70,08	16,56	11mm	1/4

Het is mogelijk dat uw arts een andere sterkte heeft voorgeschreven. De hoeveelheden T4 en T3 zijn dan overeenkomstig die andere sterkte.

Hoe moeten Thyreoidum capsules/tabletten worden gebruikt ?

De dosering wordt individueel door uw arts vastgesteld. Indien niet anders is aangegeven kan het beste de gehele dosis 's morgens in één keer een half uur vóór het ontbijt worden ingenomen met een ruim glas water.

Hoe moeten de capsules/tabletten bewaard worden ?

Deze kunnen heel goed bij kamertemperatuur bewaard worden. In de oorspronkelijke pot en op een droge plaats (niet op de badkamer of in de keuken). Niet in de koelkast.

Wanneer mag thyreoidum niet gebruikt worden ?

Thyreoidum mag niet worden gebruikt bij thyreotoxicose, acuut hartinfarct, hypogonadisme, nefrotisch syndroom en als vermageringsmedicatie.

Voorzichtigheid is geboden bij oudere patienten of patienten met myxoedeem, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten of een gestoorde bijnierfunctie.

Indien u overgevoelig bent voor lactose (melksuiker).

Zwangerschap en borstvoeding.

Tijdens zwangerschap kan thyreoidum worden doorgebruikt. Wel overleggen met uw arts, omdat de dosering kan moeten worden aangepast.

Thyreoidum gaat over in de moedermelk, maar in een zo geringe mate, dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de zuigeling daar nadeel van ondervindt.

Interacties.

Met bepaalde middelen kan thyreoidum een wisselwerking hebben. Overleg hierover met uw apotheker.

De werking van antistollingsmiddelen (acenocoumarol, fenprocoumon) kan worden versterkt. Hernieuwde instelling op geleide van de trombosedienst is geboden.

De opname van thyreoidum kan worden verminderd door colestyramin, colestipol, sucralfaat, ijzerbevattende middelen, antacida en norit.

Het effect van levothyroxine (T4) kan afnemen door Ritonavir.

MEDICIJNEN BIJ EEN TRAGE SCHILDKLIER

VI-21 Schildklierhormonen

(levothyroxine T4, liothyronine T3, thyreoidum)

Wat moet u weten over dit medicijn:

- Zorgt voor voldoende schildklierhormonen in uw lichaam
- Uw dokter controleert of het medicijn goed werkt
- 's Ochtends innemen, een half uur vóór het ontbijt
- Bel uw dokter bij bijwerkingen zoals hartkloppingen, diarree of zenuwachtigheid.
- Stop nooit zelf met dit medicijn.
- Medicijn vergeten? Neem het medicijn dezelfde dag nog in. Neem nooit een dubbele dosis om in te halen.

Wat merkt u van een trage schildklier?

Als uw schildklier te weinig schildklierhormoon maakt dan heeft u een trage schildklier. Als u een trage schildklier heeft kunt u zich vaak moe en lui voelen, u kunt lusteloos worden (u heeft dan geen zin om dingen te doen) en u kunt het koud hebben. Ook kunt u een droge huid krijgen met schilfers, een bol gezicht en gewichtstoename (u eet of drinkt niet meer dan normaal maar u wordt toch dikker). Vaak duurt het lang voordat u merkt dat u deze klachten krijgt. Het kan maanden duren, of zelfs jaren.

Hoe helpen de medicijnen?

De medicijnen zijn schildklierhormonen. U krijgt deze medicijnen als uw schildklier zelf niet genoeg schildklierhormoon maakt. Bijvoorbeeld door een ziekte. U kunt het medicijn ook krijgen omdat u geen schildklier heeft, of maar een deel van de klier. Als u schildklier remmende medicijnen gebruikt dan is het soms ook nodig om schildklierhormonen te gebruiken.

Hoe lang moet u de medicijnen gebruiken?

U moet de medicijnen meestal voor een lange tijd gebruiken.

Wanneer merkt u dat de medicijnen helpen?

De eerste 2 weken krijgt u een lage dosering (dosering is de hoeveelheid die je van een medicijn in één keer moet innemen) van het medicijn. Daarna neemt u volgens een schema meer van het medicijn. De dokter zal uw bloed regelmatig controleren om te kijken of u genoeg van het medicijn gebruikt en of het medicijn goed werkt.

Wat kunt u nog meer voelen als u deze medicijnen gebruikt (bijwerkingen)?

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Meestal krijgt u bij deze medicijnen geen bijwerkingen. Soms is er eventjes teveel schildklierhormoon in uw lichaam aanwezig. U kunt dan hartkloppingen krijgen (het hart slaat sneller dan normaal), dunne ontlasting (poep) krijgen en zenuwachtig worden. Heeft u last van deze klachten? Bel dan uw dokter. Stop nooit zelf met uw medicijn.

Hoe neemt u de medicijnen in?

Tenzij anders voorgeschreven, moet u de medicatie 's ochtends als u opstaat innemen, dus vóór het ontbijt. Doe dit in één keer, met een glas water. Wacht daarna een half uur met het ontbijt. Als u het medicijn vergeten bent, dan kunt u deze later op dezelfde dag nog innemen. U mag nooit een dubbele dosis nemen op één dag, om zo de vergeten dosis in te halen.